

플케어®



일반의약품

분류번호 : 265

[제품명] 플케어플러스크림 (테르비나핀염산염)

[원료약물 및 분량] 1g증

- 유효성분: 테르비나핀염산염(테르비나핀으로서 8.66mg) [P] 10mg
- 첨가제(보존제): 고지옥시벤조익리페릴(P) 1.0mg
페리옥시벤조익리페릴(P) 0.5mg
- 기타첨가제: 세垸을, 소르비탄모노스테아레이트, 수산화나트륨, 스테아릭산코올, 유용파라핀, 청색수, 폴리소프레이트 60, 프로필렌글리콜

[성상] 환색의 크림제

[효능·효과]

1. Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부·사상증에 의한 피부진균증(감염증: 족부백선(무좀), 고지옥신대리(백선)[판년세나니-백선]), 족부백선 2. Phytopsorium orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기 3. 피부진(피종)

[용법·용량]

1일 1~2회 환부(질환부위)에 바른다.

질환에 따른 치료기간은 다음과 같다

1. 족부백선(무좀): 1일 1회, 1주
지간형(발가락사이): 족부백선(무좀): 1일 2회, 1주
족지형(발바닥): 족부백선(무좀): 1일 2회, 2주
2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선): 1~2주

3. 피부칸디다증: 1~2주

4. 어루러기: 2주

치료기간 이후에도 일상적인 증상이 개선되지 않으면 전단을 다시 해야 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에過민반응 또는 그 병력이 있는 환자
2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
3) 소아

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우

- 2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우

- 3) 피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 발진, 홍반(붉은 반점), 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리(벗겨짐), 상처의 막지, 세소침착이상, 자동(剥落)(찌르는 것 같은 아픔), 적멸감(화끈감)이 적용부위에 나타나는 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.
- 2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균(곰팡이)약물을 시행할 것.
- 3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.
- 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 쟁흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성이 허락하니 상처부위, 넓은 부위, 엉아(젖먹이, 깃난아기)(표면적/체중의 비율 및 바내웃의 밀봉효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 활성탄으로 중성분을 제거하고 필요시 대증요법(증상별로 치료하는 방법)을 실시할 것.
- 6) 이 약은 외용으로만 적용할 것.
- 7) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말 것. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드롭게 잠재성 친균(곰팡이)감염이 악화될 수 있다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낼 것.
- 8) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 말 것.
- 9) 모로모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 경독성이 나타났다는 보고가 있다.

5. 저감성의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에 끼어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위]

30g/튜브

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기한]

제조일로부터 36개월
외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용

[첨부문서 작성일자]

2019년 01월 17일

[소비자 상담실]

☎ 02-2037-7399



일반의약품

분류번호 : 265

[특약지도]

- 재발을 막기 위해 처방된 용법과 정해진 기간을 반드시 지켜주세요.
- 환부를 깨끗하게 하고 완전히 건조시킨 후에 적용하세요.
- 투여 후 손을 반드시 씻고, 눈에 들어가지 않도록 주의하세요.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유기)한이 경과되었거나
변질변태 또는 오염 되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자 이후 제품에 대한 변경사항은 식품의약품안전처 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을
참조하여 주세요.

* 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(☎1644-6223)

제조자: 시약씨엠오코리아(주) 경기도 부천시 옥산로 230번길 23

판매자: 한국에나리나(주) 서울시 강남구 테헤란로 411(삼성동) 성당빌딩 12층

www.fulcare.co.kr

201901

풀케어 플러스크림을 손대지 않고 간편하게 바르는 팁!



박스에 내장되어 있는 플러스크림 전용
브러쉬를 끼내 적당량의 크림을 바릅니다.



플러스크림 전용 브러쉬를
활용해 환부에 골고루 바릅니다.
(비비드는 때론한 앤으로 발기의 사이는
돌기가 있는 면으로 빠르시면 더욱 좋습니다.)



사용 후 플러스크림 전용 브러쉬는 물 또는
티슈로 제끗이 세척 후 건조, 보관합니다.

피부무좀 치료제 플러스크림 전용 브러쉬로
쉽게 바르고, 빠른 치료효과!